

**Al Dirigente Scolastico
Al personale scolastico
Ai Sig. Genitori degli alunni**

**Scuola dell'Infanzia
Grazia Deledda
Sede Via Garau San sperate
CAIC84100V@istruzione.it**

Oggetto: caso di Scarlattina

Alla luce dei casi di Scarlattina verificatisi nella Scuola in indirizzo, si specifica quanto segue al fine di limitarne la diffusione:

Cos'è la scarlattina?

È una malattia causata da un batterio, lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A.

I sintomi compaiono all'improvviso dopo 2-7 giorni di incubazione con malessere generale, febbre anche elevata, mal di gola, mal di testa, lingua a fragola, nausea, vomito.

Dopo alcuni giorni si manifesta un tipico esantema con comparsa di puntini color rosso pallido, prevalentemente sul torace.

In alcuni casi, l'infezione può presentarsi solo con faringotonsillite e/o con febbre.

Una terapia correttamente e precocemente eseguita può evitare recidive o complicanze.

Come si diffonde la scarlattina?

Direttamente per via aerea, tramite le goccioline di saliva emesse respirando, tossendo, starnutendo, cantando, oppure attraverso le mani infette od oggetti contaminati da secrezioni (giocattoli, stoviglie, biancheria, superfici varie).

Fattori favorenti il contagio sono l'affollamento degli ambienti e l'insufficiente ricambio d'aria, le basse temperature, età infantile.

Contagiosità

Si è contagiosi dalla comparsa dei sintomi della malattia e per tutta la sua durata.

La contagiosità si interrompe dopo circa 48 ore dall'inizio di adeguata terapia antibiotica secondo prescrizione medica.

Diagnosi e terapia

La diagnosi, effettuata dal Pediatra, mediante l'esame clinico ed eventuale tampone faringeo, sarà seguita dalla terapia antibiotica, mirata, precoce e di durata congrua.

Soltanto dopo controllo medico, dopo almeno 48 ore di terapia antibiotica, e in buone condizioni di salute, il bambino può essere riammesso alla frequenza scolastica.

Come prevenirla?

La diffusione in ambito scolastico si contrasta con la diagnosi e il trattamento precoci del caso.

ASL8 - Cagliari
Data: 2024-01-22 09:09:08.0, PG/2024/5145

ASL 8 Cagliari Viale Lungomare Poetto 12 , 09126 Cagliari P. IVA: 3990570925 www.nuovo.aslcagliari.it	Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Via Romagna, 16 – Pad. D, 09127 Cagliari Segreteria: tel.070 47 44 3918 – 47 44 3921 dipartimento.prevenzione@aslcagliari.it	Servizio Igiene e Sanità Pubblica Direttore: Dott. Antonio Frailis Piazza De Gasperi, 2, 09125 Cagliari Tel.: 070 609 4728 igienepubblica.aslcagliari@atssardegna.it igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it
---	---	---

Pertanto un bambino che presentasse anche uno solo dei sintomi sopradescritti (es. febbre anche lieve) deve essere condotto dal pediatra e non a scuola, in particolare se già sono stati segnalati altri casi di scarlattina.

È fondamentale favorire la comunicazione e l'informazione per le vie brevi tra le famiglie e la scuola al fine di allertarle sulla presenza di casi della malattia.

Nell'ambito della prevenzione e della profilassi, fondamentali "le misure di controllo ambientale e comportamentale" da seguire in ambiente domestico e scolastico qui di seguito elencate:

1. Lavaggio frequente accurato delle mani: è la principale misura di comportamento di tipo preventivo:

Quando?

- Prima e dopo manipolazione e consumo di alimenti
- Dopo ogni utilizzo dei servizi igienici
- Dopo la manipolazione di oggetti sporchi o potenzialmente contaminati (giochi, materiale scolastico, superfici varie)

Utilizzare sempre sapone liquido e asciugamani monouso.


2. Sanificazione e disinfezione di superfici, ambienti e oggetti: giornalmente e in base alla frequenza di utilizzo, per ridurre il numero dei germi presenti, occorre rimuovere accuratamente lo sporco con i normali detersivi in commercio (sanificazione). Segue la disinfezione, di routine e di emergenza, con prodotti a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% e allo 0,5% per superfici visibilmente imbrattate. Si raccomanda di indossare sempre guanti in gomma monouso. Per l'utilizzo della soluzione allo 0,5% è necessario l'allontanamento degli alunni e l'aerazione.
3. Ricambio frequente dell'aria negli ambienti: almeno per 10 minuti ogni ora.

Si invitano pertanto i Sig. Genitori a darne immediata comunicazione al proprio pediatra di base, per migliorare il riconoscimento precoce, la segnalazione e l'inizio tempestivo del trattamento di tutte le forme di malattia da Streptococco di gruppo A.

Per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento, si prega di contattare il Servizio scrivente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, ai seguenti numeri di telefono: 0706094703-0706094732-0706096672.

Cagliari, 19/01/2024



Il S. Direttore del Servizio

Dottor Gabriele Mereu

ASL 8 Cagliari Viale Lungomare Poetto 12 , 09126 Cagliari P. IVA: 3990570925 www.nuovo.aslcagliari.it	Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Via Romagna, 16 – Pad. D, 09127 Cagliari Segreteria: tel.070 47 44 3918 – 47 44 3921 dipartimento.prevenzione@aslcagliari.it	Servizio Igiene e Sanità Pubblica Direttore: Dott. Antonio Frailis Piazza De Gasperi, 2, 09125 Cagliari Tel.: 070 609 4728 igienepubblica.aslcagliari@atssardegna.it igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it
---	---	---